

ការហូរឈាមច្រមុះ

ការហូរឈាមច្រមុះ កើតឡើងជាញឹកញាប់បំផុត នៅពេលដែលសរសៃឈាមតូចៗនៅខាងក្នុងរន្ធច្រមុះបានដាច់រំហែក ដោយសារខ្យល់បកទៅច្រមុះខ្លាំង រឺជាលទ្ធផលនៃការកន្តាស ការឆ្លុះ រឺ ការញើសសំបោរ។ ឈាមច្រមុះក៏អាចកើតឡើងពីលទ្ធផលនៃការកើនសំពាធឈាមខ្ពស់ ។

គោលបំណងរបស់អ្នក គឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ឈាម និង ដើម្បីរក្សាផ្លូវដង្ហើមអោយនៅចំហរ ។

ការព្យាបាល ដាក់អោយអ្នកជំងឺអង្គុយចុះ។ ផ្សៀងក្បាលអ្នកជំងឺទៅមុខដើម្បីអោយឈាមហូរចេញពីរន្ធច្រមុះ។ សូមអោយអ្នកជំងឺដកដង្ហើមតាមមាត់ (វានឹងមិនមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដោយខ្យល់) និង ច្របាច់ផ្នែកទន់នៃច្រមុះ។ សូមនិយាយលើកទឹកចិត្ត និង ជួយអ្នកជំងឺបើចាំបាច់។ ប្រាប់អ្នកជំងឺអោយរក្សាការច្របាច់ច្រមុះនោះ។ ផ្តល់ដំបូន្មានអោយអ្នកជំងឺកុំអោយនិយាយ លេប ក្អក ស្មោះ រឺហិតខ្យល់ចូល ពីព្រោះវាអាចរំខានដល់កំណកឈាម ដែលអាចនឹងកំពុងកកក្នុងច្រមុះ។ បន្ទាប់ពី១០នាទី ប្រាប់អោយអ្នកជំងឺឈប់ច្របាច់ច្រមុះ។ ប្រសិនបើការហូរឈាមមិនទាន់ឈប់ ប្រាប់គាត់អោយច្របាច់ច្រមុះអោយបាន រយៈពេល ១០នាទីពីរដងទៀត។ នៅពេលឈាមឈប់ហូរដោយអ្នកជំងឺនៅអោនក្បាលទៅមុខ ត្រូវសំអាតជុំវិញច្រមុះដោយប្រើទឹកក្តៅឧណ្ហ១។ ផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នកជំងឺអោយសំរាកស្ងៀមចំនួនពីរថ្ងៃម៉ោង។ ប្រាប់អ្នកជំងឺកុំអោយប្រើកំលាំងខ្លាំង និង ជាពិសេសមិនអោយបញ្ចេញខ្យល់ខ្លាំង តាមច្រមុះ ពីព្រោះសកម្មភាពទាំងនេះធ្វើអោយរំខានដល់កំណកឈាម ។

ចតុម្ពិមួយចូលភ្នែក

ជាធម្មតា វត្ថុទាំងនោះអាចលាងយកចេញយ៉ាងស្រួល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកមិនត្រូវប៉ះអ្វីមួយដែលនៅស្ថិតជាប់ទៅនឹងភ្នែក ដែលចូលទៅក្នុងគ្រាប់ភ្នែក រឺ ដែលស្ថិតនៅលើផ្នែកពណ៌នៃភ្នែកឡើយ (ប្រស្រីភ្នែក និង កូនក្រមុំ) ព្រោះវាអាចធ្វើអោយខូចភ្នែក។ ជំនួសមកវិញ ចូរអោយប្រាកដថាអ្នកជំងឺទទួលបានការថែទាំពីផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រទាន់ពេលវេលា។

ការព្យាបាល: គោលបំណងរបស់អ្នក គឺការពារការរងរបួសដល់ភ្នែក ។

- ដាក់អោយអ្នកជំងឺអង្គុយបែរមុខទៅពន្លឺ ។
- ព្យែកត្របកភ្នែកទាំងពីរដោយថ្មមៗ ដោយប្រើម្រាមដៃចង្កុល និង មេដៃរបស់អ្នក ។
- ត្រូវពិនិត្យគ្រប់ផ្នែកនៃភ្នែក អោយអ្នកជំងឺមើលទៅលើ ក្រោម ឆ្វេង និង ស្តាំ
ប្រសិនបើអ្នកឃើញវត្ថុណាមួយនៅផ្នែកសនៃភ្នែក:
- លាងយកវាចេញដោយប្រើទឹកស្អាតសំរាប់លាងភ្នែក រឺ ទឹកស្អាតចាក់មកពីកែវ ។
- ដាក់ក្បាលអ្នកជំងឺទៅកន្លែងរងរបួស ហើយដាក់កន្សែង រឺ ទ្រនាប់ដាក់លើស្មាររបស់អ្នកជំងឺ ។
- ចាក់ទឹកពីក្តោងច្រមុះអោយវាហូរកាត់ និង បង្ហូរលាងភ្នែក ។
- ប្រសិនបើមិនជោគជ័យ យកវត្ថុនោះចេញពីផ្នែកសនៃភ្នែក ដោយប្រើជក់សំឡីសើម ។
- ប្រសិនបើវានៅមិនជោគជ័យទៀត ត្រូវរកជំនួយពីផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ។

ចតុរ្យមួយនេះក្រោមគ្របលើភ្នែកលើ

- អោយអ្នកជំងឺទាញគ្របកន្លែកលើចុះក្រោមមកគ្របលើគ្របកន្លែកក្រោម ។
- រោមភ្នែកក្រោម អាចជួយបោសយកវត្ថុនោះចេញបាន ។

ប្រុងប្រយ័ត្ន៖

- **កុំប៉ះ**អ្វីដែលកំពុងស្អិតជាប់ រឺ កប់នៅក្នុងគ្រាប់ភ្នែក រឺ ប្រស្រីភ្នែក, គឺកុំប៉ះផ្នែកពណ៌នៃភ្នែក ។
- ដាក់ទ្រនាប់គ្របភ្នែក គ្របលើភ្នែក ។
- យក រឺ បញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យ ។

លោកដោយការជុំគំរាម និង លោកដោយអន្តរាគមន៍រក្សា

ការព្យាបាល

- ចាប់ផ្តើមធ្វើអោយត្រជាក់ភ្លាមៗនៃការរលាកនោះ ដោយដាក់វានៅក្រោមទឹកកំពុងហូររយះពេលយ៉ាងតិច១០នាទី
- បន្តចាក់ទឹកត្រជាក់នៅលើកន្លែងរលាកនោះយ៉ាងតិច១០នាទី រឺ រហូតដល់ការឈឺចាប់បានថយចុះ ។
- ដោះគ្រឿងអល់ហ្គា នាឡិកា រឺ សំលៀកបំពាក់ពិកន្លែងដែលរងរបួសនោះ—លុះត្រាវាជាប់ទៅនឹងស្បែក ។
- គ្របកន្លែងរលាកនោះដោយប្រើសំភារៈស្អាត មិនមានជាតិសំឡីរោម ដើម្បីការពារវាកុំអោយមានការបង្ករោគ ។

ប្រសិនបើការរលាកតូចតាចនោះ ធំជាងទំហំតែម្តែប្រសព្វយី វាត្រូវការ ការយកចិត្តទុកដាក់ពីផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ។

គ្រប់ការរលាកជ្រៅទំហំណាក៏ដោយ ត្រូវការអោយមានការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ ។

ការច្នៃឈាម

ការដាច់មុតតូចតាច, ការរលាត់, ការប្រេះស្បែក

ការព្យាបាល

- លាង និង សំបូតដៃរបស់អ្នកឯងផ្ទាល់ ។
- គ្របស្នាមដាច់នៅលើដៃរបស់អ្នកផ្ទាល់ ហើយពាក់ស្រោមដៃប្រើហើយបោះចោល ។
- ប្រសិនបើខ្ញុំ លាងសំអាតស្នាមមុតដាច់នោះនៅក្រោមទឹកដែលកំពុងហូរ ។ ជូតសំបូតដោយប្រើក្រណាត់ស្អាត រឺ សំភារៈស្អាតដែលគ្មានកំទេច ។ ប្រសិនបើទៅរួច លើកកន្លែងដែលរងគ្រោះនោះអោយខ្ពស់ជាងបេះដូង ។
- គ្របស្នាមមុតដាច់នោះជាបណ្តោះអាសន្ន ខណៈពេលអ្នកសំអាតស្បែកដែលនៅជុំវិញជាមួយសាប៊ូនិងទឹកហើយជូតសំបូតស្បែកដែលនៅជុំវិញនោះ ។ គ្របកន្លែងមុតដាច់នោះអោយបានពេញលេញ ជាមួយក្រណាត់ស្អាត រឺ បង់បិតដំបៅ ។

ការហូរឈាមច្រងូង

ការព្យាបាល

- ពាក់ស្រោមដៃប្រើហើយបោះចោល ។
- សង្កត់របួសនោះដោយប្រើដុំទ្រាប់ (ឧទាហរណ៍ ក្រណាត់ស្អាត) រឺ សង្កត់ដោយប្រាមដៃរហូតដល់រកក្រណាត់ស្អាតប្រើបាន
- លើក និង ទ្រ អវៈយវៈដែលរងរបួសនោះ ។ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថា ឆ្អឹងបានបែកបាក់ ។
- ដាក់អ្នកជំងឺដេកដើម្បីព្យាបាល shock ។
- រុំទ្រនាប់ រឺ ក្រណាត់នោះអោយជាប់ល្អដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរឈាម ប៉ុន្តែមិនត្រូវតឹងពេកទេ ដែលអាចអោយចរន្តឈាមឈប់ហូរទៅប្រាមដៃ រឺ ប្រាមជើង ។ ប្រសិនបើការហូរឈាមនោះជ្រាបចេញតាមបង់រុំទី១ ត្រូវរុំជាមួយបង់ទី២ទៀត ។ ប្រសិនបើឈាមនៅជ្រាបចេញតាមបង់រុំនោះទៀត ត្រូវយកវាចេញ ហើយរុំម្តងទៀត ។
- ព្យាបាល shock ។
- ទូរសព្ទហៅឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ ។

វត្តអូរមួយនៅក្នុងរូប

ប្រសិនបើអាច ផ្តិត រឺ លាងវត្តតូចៗចេញពីរបួសដោយទឹកស្អាត ។ ប្រសិនបើមានវត្តធំនៅកប់ខាងក្នុង:

ការព្យាបាល

- ទុកវានៅនឹងកន្លែង ។
- សង្កត់នៅចំហៀងណាមួយនៃវត្តនោះ ។
- លើក និង ទ្រ អវៈយវៈ រឺ ផ្នែកដែលរងរបួស ។
- ដាក់អ្នកជំងឺអោយដេកសំរាក ដើម្បីព្យាបាល shock ។
- គ្របរបួសនិងវត្តនោះផ្ទុមៗ ដោយក្រណាត់ស្អាត ។
- រុំបង្កើតទ្រនាប់ជុំវិញវត្តនោះ រហូតដល់ទ្រនាប់នោះខ្ពស់ជាងវត្តដែលនៅក្នុងរបួសនោះ បន្ទាប់មករុំបង់លើវត្តនោះដោយមិនសង្កត់លើវា ។
- អាស្រ័យលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការហូរឈាមនោះ អាចទូរសព្ទហៅឡានពេទ្យ រឺ នាំយកអ្នកជំងឺនោះទៅមន្ទីរពេទ្យ ។