

# ការទប់ស្កាត់ការឈឺចាប់

យើងអាចជួយទប់ស្កាត់ការឈឺចាប់ក្នុងវិស័យទទួលស្គាល់ដោយ:

ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់

ថ្នាំស្លឹក

ថ្នាំសណ្តស្មារតី

ថ្នាំសណ្ត (សន្លប់)

## ថ្នាំស្លឹក

នៅក្នុងថ្នាំស្លឹក យើងបញ្ឈប់ការបញ្ជូនរបស់សញ្ញាណទទួលអារម្មណ៍ ពីចុងសសៃប្រសាទទៅខួរក្បាល។ យើងធ្វើវាដោយចាក់សារធាតុគីមីធ្វើអោយស្លឹកនៅចុងសសៃប្រសាទ រឺ តាមបណ្តោយផ្លូវរបស់សសៃប្រសាទ។ សកម្មភាពរបស់សារធាតុគីមី ដើម្បីបញ្ឈប់សញ្ញាណទាំងនេះ មានរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់មកអារម្មណ៍ទាំងអស់នឹងត្រលប់មកសភាពធម្មតាវិញ។

ថ្នាំស្លឹកលាបនៅនឹងកន្លែង (topical anaesthesia)



ថ្នាំស្លឹកលាបនឹងកន្លែង អាចមានជាប្រភេទ ចាហួយ ក្រែម រឺ ថ្នាំបាញ់ ហើយវាមានផ្ទុក Lidocaine រឺ benzocaine ។

ពួកវា ត្រូវបានលាបលើអធ្មាញ មុនពេលចាក់ថ្នាំ និង ជួយកាត់បន្ថយការទទួលអារម្មណ៍ពីផ្ទៃខាងក្រៅមុននឹងចាក់ថ្នាំស្លឹក។ វាត្រូវការរយៈពេល២នាទីដើម្បីស្លឹក ហើយវាស្លឹកយ៉ាងហោចណាស់ប្រហែល១០នាទី។

ជួនកាល ពួកវាអាចគេយកមកប្រើមុននឹងវះបើកមុខ/កាត់ បូស និង មុនពេលយកពុម្ពធ្មេញ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺងាយនឹងក្អកក្អង។

## អំពូលថ្នាំស្លឹក (Anesthetic cartridge)

សូលុយស្យុងថ្នាំស្លឹកមាននៅក្នុងអំពូលកែវជាមួយឆ្នុកជ័រដែលអាច

ផ្លាស់ទីបាន។ វាមាន ២ចំណុះគឺ 1.8ml និង 2.2ml ដើម្បីត្រូវនឹងសីរ៉ាំងប្រភេទខុសៗគ្នា។ ភ្នាក់ងារធ្វើអោយស្លឹកនោះជាធម្មតាគឺ Lidocaine, Prilocaine រឺ Articaine ។

ក្រៅពីភ្នាក់ងារធ្វើអោយស្លឹក ក៏មាន ទឹកលាយអំបិល និងសារធាតុរក្សាគុណភាពផងដែរ។

នៅក្នុងអំពូលថ្នាំស្លឹកភាគច្រើន ក៏មានសារធាតុធ្វើអោយសសៃ

ឈាមរួមតូច (vasoconstrictor)។ សារធាតុគីមីនេះ ធ្វើអោយសសៃឈាមរួមតូច ដូច្នោះថ្នាំស្លឹកមិនជ្រាបចេញពីកោសិកាលឿនពេកទេ នោះនឹងអោយស្លឹកបានយូរ។ វាក៏មានន័យថា នឹងមានការហូរឈាមតិចនៅតំបន់នោះ។



ជាធម្មតា vasoconstrictor ដែលគេប្រើគឺ Adrenalin/Epinephrine ហើយក្នុងថ្នាំស្លឹកប្រភេទ Citranest, Octapressin (felypressin) ត្រូវបានគេប្រើ។ Octapressin មិនត្រូវបានណែនាំអោយប្រើចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទេ។

ថ្នាំស្លឹកដែលមានជាតិ Adrenalin/Epinephrine អាចបណ្តាលអោយចង្វាក់បេះដូងដើរលឿន ប្រសិនបើចែងឱ្យចាក់ចូលទៅក្នុងសសៃឈាម ដូច្នោះហើយសិរ្សថ្នាំស្លឹកដែលអាច aspirate គួរយកមកប្រើប្រាស់ ប្រសិនបើមានហានិភ័យនៃការចាក់ចូលទៅសសៃឈាម។ Aspirating មានន័យថា ឆ្កុកជ័រត្រូវបានទាញថយក្រោយដើម្បីពិនិត្យមើល ប្រសិនបើចុងមូលគឺនៅក្នុងសសៃឈាម--ឈាមពណ៌ក្រហមនឹងឃើញនៅក្នុងអំពូលថ្នាំស្លឹក។

អំពូលថ្នាំស្លឹកខ្លះមានឆ្កុកមួយដែលមានផ្នែកកណ្តាលទន់ដើម្បីរលាស់ថយក្រោយវិញ។

ថ្នាំស្លឹកដែលមានជាតិ Adrenaline គួរតែប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរ។



អំពូលថ្នាំស្លឹកខ្លះមានឆ្កុកដែលផ្នែកកណ្តាលទន់ដើម្បីរលាស់ថយក្រោយវិញ។

សិរ្សមួយចំនួនមានចុងស្រួចដែលមូលចូលទៅក្នុងឆ្កុកជ័រ



របៀបចាក់ថ្នាំស្លឹកសំខាន់ៗ ៣យ៉ាង ប្រើមុនពេលព្យាបាល គឺ :



**Infiltration Injection:** ប្រើចំពោះធ្មេញលើ និង ធ្មេញក្រោមផ្នែកខាងមុខ។ សិរ្សដោយប្រើមូលខ្លី ត្រូវចាក់នៅជាប់នឹងចុងរឹសរបស់ធ្មេញ រីកន្លែងដែលត្រូវធ្វើអោយស្លឹក។

**Block Injection:** សិរ្សដែលអាច aspirate ដោយមានមូលវែង ត្រូវបានប្រើ ហើយសឹកទៅជិតសសៃប្រសាទធំ ហើយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នកុំចាក់ចូលទៅក្នុងសសៃឈាមដែលនៅជិតខាង។

**Inferior Dental Nerve Block (IDB):** គឺប្រើដើម្បីធ្វើអោយស្លឹកធ្មេញក្រោមទាំងអស់នៅផ្នែកម្ខាង។





**Intra-ligament injection** : សីរ៉ាំងពិសេសត្រូវបានប្រើជាមួយអំពូលថ្នាំស្តីកចំណុះ 1.8ml ហើយនឹងម្ជុលខ្លីបំផុត។ ការចាក់ប្រព្រឹត្តទៅដោយអោយទន្តពេទ្យបង្ខំថ្នាំស្តីកអោយចូលទៅចន្លោះធ្មេញ និង ឆ្អឹង--Periodontal ligament ។ ការចាក់នេះត្រូវតែធ្វើទៅ**យឺតៗបំផុត** នៅខាងណាក៏បាននៃធ្មេញ។

ការចាក់ប្រភេទនេះ មានន័យថា មានតែធ្មេញមួយនោះប៉ុណ្ណោះ ដែលបានធ្វើអោយស្តីក គឺមិនមែនតំបន់នៅជុំវិញនោះច្រើនទេ។ ការចាក់នេះអាចនឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះកុមារ ដោយសារកុមារទាំងនេះ មិនបានឃើញមូលធំ ហើយវាមិនមានអារម្មណ៍ថា មូលត្រូវបានចាក់ចូលទៅក្នុងអញ្ចាញរបស់ពួកគេ។

**សុវត្ថិភាពនៃការប្រើមូល**



បន្ទាប់ពី មូលត្រូវបានប្រើរួច វាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ ដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតដើម្បី ចៀសវាងការបង្ករបួសដល់ទន្តពេទ្យ រឺ ជំនួយការទន្តពេទ្យ ហើយគំរូមូលមិនត្រូវគ្របមូល ដោយប្រើដៃដោយគ្មានប្រើរបាំងការពារមូលឡើយ។

មូលសុវត្ថិភាពពិសេស មានអោយប្រើប្រាស់ដែលមានបន្ទះជ័រ ដើម្បីការពារ និង អាចអោយ ដោះវាចេញពីសីរ៉ាំង។

មូលក្រោយពីប្រើប្រាស់រួច ជានិច្ចជាកាលត្រូវតែដាក់វានៅក្នុងប្រអប់រឹងអាចបិទជិត ដែលអាច ដែលអាចអោយគេយកទៅដុតវិលាយបាន។



**ព្រោះថ្នាក់នៃថ្នាំស្តីក**

ការពន្យល់ណែនាំគួរត្រូវបានផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺ មុននឹងចាក់ថ្នាំស្តីក ដូច្នោះពួកគេនឹងយល់អំពីអ្វីដែលនឹងត្រូវរំពឹងទុក។ អាចនឹងមានភាពមិនស្រួល ហើយជួនកាលមានការឈឺចាប់មួយចំនួន នៅពេលចាក់ថ្នាំនោះ--នេះដោយសារម្តងបានឆ្លងកាត់សាច់ដុំ រឺ សសៃប្រសាទ។ ការចាក់នោះក៏នឹងឈឺខ្លាំងដែរ ប្រសិនបើការចាក់នោះលឿនពេក។

អ្នកជំងឺគួរត្រូវបានគេប្រាប់មុនថា ឥទ្ធិពលថ្នាំស្តីកអាចមានរយៈពេល បីបួនម៉ោង ហើយពួកគេត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់កុំខាំអណ្តាត ថ្ពាល់ រឺ បបូរមាត់ដោយសារពួកគេមិនអាចមានអារម្មណ៍ដឹងនៅកន្លែងនោះឡើយ។ អាហារ និង ភេសជ្ជៈក្តៅ មិនគួរបរិភោគឡើយដើម្បីចៀសវាងការរលាកនានា។

អាចមានភាពមិនស្រួលមួយចំនួន (ឈឺតិចតួចណាស់) បន្ទាប់ពីថ្នាំស្តីកអស់ប្រសិទ្ធភាព ដោយសារមានការហូរឈាមទៅក្នុងជាលិកា និងសាច់ដុំនៅកន្លែងដែលម្តងបានចាក់ចូល ជាពិសេសជាមួយនឹងការចាក់ inferior dental block ។

អ្នកជំងឺមិនត្រូវទុកអោយនៅតែម្នាក់ឯង បន្ទាប់ពីបានទទួលចាក់ថ្នាំស្តីកឡើយ ព្រោះករណីខ្លះអាចមានផលវិបាកកើតឡើង។

**ការសន្លប់** គឺជាបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងជារឿយៗ បន្ទាប់ពីចាក់ថ្នាំស្តីក--ជាពិសេសនៅពេលធ្វើ inferior dental block ហើយថ្នាំស្តីកមួយចំនួនបានចាក់ដោយចៃដន្យចូលទៅក្នុងសសៃឈាម។ ការសន្លប់ គឺកើតឡើងជាញឹកញាប់ខ្លាំង ប្រសិនបើអ្នកជំងឺអង្គុយបញ្ឈរត្រង់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺពាក់ខោអាវច្រើនជាន់ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានភាពភ័យខ្លាចខ្លាំង រឺក៏ប្រសិនបើអ្នកជំងឺមិនបានបរិភោគអាហារ។ វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដែលជំនួយការទទួលបានជួយអោយអ្នកជំងឺសំរាករឺបន្ធូរអារម្មណ៍ដោយការពន្យល់ណែនាំល្អៗ ពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើង ដោយធានាថាមិនមានសំលៀកបំពាក់លើសច្រើន រឺ សំលៀកបំពាក់តឹងនៅក ហើយនិយាយទៅកាន់អ្នកជំងឺក្នុងពេលកំពុងដំណើរការព្យាបាល។

**កំណកឈាម**--ដោយសារការចាក់នោះត្រូវបានធ្វើឡើង នោះម្តងអាចធ្វើអោយខូចខាតដល់សសៃឈាម ហើយជាលិកាអាចចាប់ផ្តើមហើម (កើនឡើងទំហំ)។ វាអាចធំខ្លាំង--វាអាចក្រហម ហើយប្តូរទៅជាពណ៌ត្នោត រួចមកលឿងក្នុងរយៈពេល ១០ថ្ងៃក្រោយ។ ការផ្លាស់ប្តូរពណ៌ ( រឺ ស្នាមជាំ) អាចរាលដាលចុះក្រោមរហូតមកដល់ ៣។

**ហាមាត់មិនរួច**--បន្ទាប់ពីធ្វើ inferior dental block ប្រសិនបើមានការខូចខាតដល់សសៃឈាម រឺ សាច់ដុំហើយមានការហើម វានឹងពិបាក និង មានការឈឺចាប់ក្នុងការហាមាត់--វាត្រូវបានគេហៅថា trismus និងមានរយៈពេលបីបួនថ្ងៃ។

**នៅបន្តស្តីក**--នេះអាចកើតឡើងក្នុងករណីម្តងបានធ្វើអោយសសៃប្រសាទខូចខាតអំឡុងពេលចាក់--វាកំណត់ ទោះបីជាទទួលបានជារឿយៗ ព្យាយាមចាក់ទៅដល់សសៃប្រសាទដើម្បីធ្វើអោយស្តីកវាក៏ដោយ។ ប្រសិនបើមានការខូចខាតកើតឡើង វាអាចត្រូវការរយៈពេលពីរបីសប្តាហ៍ រឺ រាប់ខែមុននឹងមានការទទួលបានអារម្មណ៍ធម្មតាឡើងវិញ។

## ថ្នាំសណ្តែស្មារតី

- នេះគឺជាវិធីមួយនៃការកាត់បន្ថយការភ័យខ្លាច និង ការឈឺចាប់ របស់ដំណើរការព្យាបាលធ្មេញ
- មិនមានការបាត់បង់ស្មារតីទេ
- មាន២របៀបនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំសណ្តែស្មារតី:



**ការសណ្តែដោយការស្រូប:** អ្នកជំងឺស្រូបនូវកំហាប់ដ៏មានសុវត្ថិភាពនៃ ឧស្ម័ន Nitrous oxide និង អុកស៊ីសែន ហើយបន្ទាប់មក អ្នកជំងឺ មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលរឹសំរាក ។ ការឈឺចាប់បានបាត់បង់អស់ជាច្រើន ។ ការសណ្តែដោយស្រូប គឺជូនកាលត្រូវបានគេប្រើរួមជាមួយថ្នាំស្តីក ដែល ផ្តល់លទ្ធផលជាការព្យាបាលដែលគ្មានការឈឺចាប់ទាំងស្រុង ។ សកម្មភាពជាប្រក្រតីអាចនឹងត្រលប់មកវិញភ្លាមៗ បន្ទាប់ពី ការសណ្តែ ដោយស្រូបនោះ បានបញ្ចប់ ។

## ការសណ្តែដោយចាក់តាមសសៃរវ៉ែន

- នេះជាការធ្វើឡើងដោយការចាក់ចូលទៅក្នុងសសៃរវ៉ែននៅក្នុងដៃ ។
- មិនមានការបាត់បង់ស្មារតីទេ ប៉ុន្តែ ការភ័យខ្លាច និង ការឈឺចាប់បានបាត់បង់យ៉ាងច្រើនដើម្បីអនុញ្ញាតិអោយ មានការព្យាបាលដែលគ្មានការឈឺចាប់ ។
- អាចនឹងមិនមានការចងចាំនូវអ្វីដែលបានកើតឡើងអំឡុងពេលព្យាបាល ។
- ការសណ្តែដោយចាក់តាមសសៃរវ៉ែន អោយលទ្ធផលទៅជាភាពងងឹតចោងបន្ទាប់ពីព្យាបាល ។ ដូច្នេះ វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការត្រូវកំដរអ្នកជំងឺពេលធ្វើដំណើរទៅផ្ទះ ។
- ការបើកបរមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយ ក្នុងអំឡុងពេលយ៉ាងតិច២៤ម៉ោង ។

## ថ្នាំសណ្តែ (សន្លប់)

- ថ្នាំសន្លប់អនុញ្ញាតិអោយទន្តពេទ្យធ្វើការព្យាបាលលើអ្នកជំងឺដែលបាត់បង់ស្មារតី
- វាមានសារៈសំខាន់នៅពេលការព្យាបាលពោរពេញដោយការឈឺចាប់ និង ការលំបាក ជាលក្ខណៈពិសេសណាមួយ
- ប្រសិនបើបញ្ហាខាងអារម្មណ៍ និង អាកប្បកិរិយារបស់អ្នកជំងឺ ធ្វើអោយទន្តពេទ្យមិនអាចធ្វើការព្យាបាល នៅក្នុងបន្ទប់ព្យាបាលបាន នោះថ្នាំសន្លប់អាចដោះស្រាយបញ្ហានោះបាន ។
- ថ្នាំសន្លប់គួរតែប្រើប្រាស់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ រឺ បរិស្ថានស្រដៀងនេះប៉ុណ្ណោះ ហើយគួរប្រើប្រាស់ដោយអ្នកឯកទេសដាក់ថ្នាំសណ្តែ ។