

ការហូរឈាមបន្ទាប់ពីដកធ្មេញ

ការហូរឈាមកើតដោយសារជាលិកាអញ្ចាញ និង ជាលិកាជុំវិញធ្មេញបានរងប៉ះខូចខាត ។

បរិមាណនៃការហូរឈាមអាចកើតដោយសារ :

Local Factor :

- ទំហំនៃការខូចខាតបង្កដោយ Elevator រឺ ដង្កាប់ដកធ្មេញ
- បរិមាណនៃការរលាកជាលិកាជុំវិញធ្មេញទាំងរយៈពេលខ្លីៗ និង ជំងឺជុំវិញធ្មេញ រឺ អញ្ចាញមានលក្ខណៈយូរ

(នឹងមានឈាមមកផ្គត់ផ្គង់ កន្លែងមានជាលិកាហើម និង បុសខ្លះ ច្រើន) ។ ប្រសិនបើពួកគេមានឈាមអញ្ចាញដោយសារខ្វះការដុសធ្មេញ ប្រសិនបើមានធ្មេញរង្កើដោយសារជម្ងឺជាលិកាជុំវិញធ្មេញ នឹងមានហូរឈាមច្រើនពីរណ្តៅក្រោយដកធ្មេញ ។ ប្រសិនបើធ្មេញធំជាមួយ រឺសរីរវង់ដែលបង្កឱ្យរំហែកអញ្ចាញច្រើននៅពេលដកធ្មេញ ។

Medical Factor


អ្នកជំងឺប្រហែលមានបញ្ហាឈាមហូរព្រោះជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមស ជម្ងឺឆ្អែម ជម្ងឺឈាមក្រកក និង សំពាធឈាមខ្ពស់(លើសឈាម) ព្រោះតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំធ្វើឱ្យឈាមអត់សូវខាប់(ថ្នាំប្រឆាំងកំនកឈាម) រឺ អាស៊ីរិស ការហូរឈាមអាចបន្ថយដោយប្រើថ្នាំស្តីកទៅលើធ្មេញព្រោះក្នុងថ្នាំស្តីកមានVasoconstrictor (ធ្វើឱ្យសសៃឈាមរួម) ដោយបន្ថយលំហូរឈាម ដូចជាពពួក Adrenaline និង Epineprine ។

អ្នកជំងឺអាចត្រូវផ្តល់Chlorohexidene Gluconateទំរង់ជាទឹកសំរាប់សំអាតមាត់ រឺ gel ពីរបីថ្ងៃក្រោយមុនដកធ្មេញដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនបាក់តេរី និង កាត់បន្ថយការរលាកផ្សេងៗ ។

The Clotting System(ប្រព័ន្ធកំនកឈាម)

នៅពេលសសៃឈាមត្រូវបានប៉ះពាល់ខូចខាតវានឹងធ្វើឱ្យសសៃឈាមកាន់តែតូច បន្ទាប់មកវាបញ្ចេញកត្តាកកឈាមដែលនឹងបង្កplateletនៅក្នុងឈាមទៅតោងភ្ជាប់កន្លែងដែលប៉ះពាល់ ហើយធ្វើឱ្យសសៃប្រូតេអ៊ីនបង្កើតទៅជាកំនក ។


After an Extraction(បន្ទាប់ពីដកធ្មេញ)



ជំរើសល្អដើម្បីបញ្ឈប់ឈាមហូរ និង ជួយឱ្យជាសះស្បើយគឺត្រូវប្រើកំលាំងសង្កត់ទៅលើរណ្តៅដើម្បីបញ្ឈប់ឈាមហូរ និង ជំរុញឱ្យមានកំនកឈាម ។
អ្នកជំងឺត្រូវខាំដុំស្បែកដែលមានល្បឿន វ៉ាសេលីន ដែលដាក់លើរណ្តៅយ៉ាងខ្លាំង យ៉ាងហោចណាស់ ១០ ទៅ ១៥ នាទី ។

កន្លែងដកនោះមិនត្រូវប៉ះពាល់វា ដើម្បីកុំឱ្យដាច់កំនកឈាមដែលផុយងាយដាច់ ។ ដុំស្បែកដែលមានល្បឿន វ៉ាសេលីន ដ៏ល្អឥតខ្ចោះគឺត្រូវប៉ុនរណ្តៅធ្មេញ (ទំហំត្រូវប៉ុនរណ្តៅធ្មេញ ហើយខ្ពស់ជាងធ្មេញដែលនៅក្បែរ ដើម្បីអោយធ្មេញទល់មុខ ខាំប៉ះណែនល្អ) ។ វាត្រូវហាប់ណែនល្អដើម្បីសង្កត់លើរណ្តៅ(សំលីដែលមូលមិន បានល្អ មិនគួរប្រើទេ ពីព្រោះ វាមិនហាប់ល្អ ក្នុងការបញ្ជូនកំលាំងសង្កត់ទៅលើរណ្តៅ) ។

ដុំសំលីគួរពាសដោយVaselineជុំវិញ កុំឱ្យវាមានឈាមជាប់ជ្រៅទៅក្នុងដុំស្បែក ម៉្យាងទៀត បើមិនមានVaseline កំណកឈាម អាចដាច់មកជាមួយដុំសំលី ។ ដុំស្បែកដ៏ល្អ មិនត្រូវអោយធំជាង ដុំសំលីមូលស្រាប់ឡើយ ។ ដាក់ Vaselineខ្លះលើស្បែកខាងក្រៅ ដាក់ដុំសំលីមូល១ រឺ ២នៅលើស្បែក ហើយមូលវាឱ្យតឹងជាមួយស្បែក បន្ទាប់មកដាក់ Vaselineឱ្យច្រើនលើផ្ទៃស្បែកទាំងមូល ។



ជំនួយការពេទ្យគួរប្រាកដថាមាត់អ្នកជំងឺត្រូវស្អាតគ្មានកំទេចកំទី គ្មានឈាម និង គ្មានទឹកមាត់ នៅក្នុងមាត់ មុនពេលដាក់ដុំស្បែកនោះ លើរណ្តៅ ដើម្បីអោយអ្នកជំងឺមានសុខភាព និង មិនចងស្មោះ រឺ ខ្ពុរមាត់ ។ ជូតសំអាតឈាម ជុំវិញមាត់អ្នកជំងឺ និង បបូរមាត់ចេញ ជាមួយសំលីសើម និង សំអូតអោយស្អាតល្អ ។ បន្ទាប់ពី អ្នកជំងឺបានខាំដុំស្បែកដែលមានល្បឿន វ៉ាសេលីន ១០ទៅ ១៥ នាទី ជំនួយការពេទ្យរឺ គ្រូពេទ្យត្រូវយកដុំសំលីចេញ ហើយពិនិត្យមើល ថាតើ នៅមានឈាមហូរ រឺ អត់ មុនពេលឱ្យលំណែនាំចុងក្រោយដល់អ្នកជំងឺ មុនឱ្យគាត់ទៅផ្ទះគាត់វិញ ។

លំណែនាំទៅអ្នកជំងឺក្រោយដកធ្មេញ

- មិនឱ្យខ្ពុរមាត់ មិនឱ្យលាងមាត់ រឺ ខាកស្មោះចេញ រយៈពេល ៤ ម៉ោងបន្ទាប់ពីដកធ្មេញ
- កុំពិសារម្ហូបក្តៅ រឺ ផឹកក្តៅ រយៈពេល ៤ ម៉ោងបន្ទាប់ពីដកធ្មេញ
- មិនត្រូវហាត់ប្រាណខ្លាំងពេក មិនត្រូវផឹកស្រា មិនត្រូវជក់បារី ឡើយ
- កុំប៉ះកន្លែងដកនោះដោយអណ្តាត រឺ ដៃ ឱ្យសោះ
- ប្រើ ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ បន្ទាប់ពីជាតិថ្នាំស្តីកអស់ ព្រោះវាអាចមានការឈឺចាប់

ប្រសិនបើឈាមនៅតែហូរមិនឈប់ រឺ នៅតែឈឺលើសពី ២ ថ្ងៃ សូមទាក់ទងមកគ្លីនិកព្យាបាល ។ វាប្រសើរណាស់ ដែលសេវាការណែនាំទៅឱ្យអ្នកជម្ងឺក៏ដូចជានិយាយប្រាប់គាត់ ។ ហើយដុំស្បែកបន្ថែម អាចផ្តល់អោយអ្នកជម្ងឺ បើសិនជា យើងគិតថា អាចនៅមានការហូរឈាមទៀត ។ បញ្ហា ដែលអាចកើតក្រោយពីដកធ្មេញរួមមាន : ហើម ជាំ ជាប់គាំង ការហូរឈាម និង ឈឺ

ការហើម អាចកើតដោយសាររលាកជាលិកាជុំវិញធ្មេញ វាក៏រកើតលើការដកធ្មេញ ។ ការហើមអាចកាត់ បន្ថយទៅវិញដោយយើងគ្រាន់តែស្តុំទឹកកកនៅលើផ្តាស់ ត្រង់កន្លែងហើម បន្ទាប់ពីដកធ្មេញ រឺ វះកាត់ ។ **ភាពជាំ** គឺជាលទ្ធផលនៃលំហូរឈាមទៅជាលិកាជុំវិញរណ្តៅធ្មេញ តែវាមិនសូវមានទេ លើការដកធ្មេញធម្មតា និង មនុស្សវ័យជំទង់ ប៉ុន្តែ វាកើតមានជាញឹកញាប់ ជាមួយការដកធ្មេញថ្លាមទាល់ខាងក្រោមពិបាកៗ វាមិនមានការឈឺចាប់អ្វីទាំងអស់ ហើយ មួយអាទិត្យក្រោមមក វានឹងបាត់ទៅវិញ ។

ភាពជាប់គាំង គឺការរឹងសាច់ដុំ នៅពេលអ្នកជម្ងឺព្យាយាមហាមាត់ វាកើតដោយសារការចាក់ថ្នាំស្លឹក IDB ប្រើនៅក្នុងការដកធ្មេញថ្លាមខាងក្រោម ហើយវាធ្វើឱ្យខូតខាត និង ហើមសាច់ដុំ ។

ការហូរឈាម បើនៅតែហូរឈាម ២ រឺ ៣ ម៉ោង បន្ទាប់ពីដកធ្មេញ ជាទូទៅ នេះជា លទ្ធផលនៃ ការមិនមានកំនកឈាមល្អ នៅលើអព្ភាញដែលរលាក ហើយនិង លំហូរឈាមចេញមកមិនឈប់ ។



អ្នកជម្ងឺអាចមានដុំកំនកឈាមធំៗ ជាច្រើនក្នុងមាត់របស់ គាត់ ។ មាត់អ្នកជម្ងឺត្រូវតែសំអាតថ្មមៗដោយស្បែកសើម ហើយអោយអ្នកជម្ងឺ ខាំដុំស្បែកមានវ៉ាសេលីន ១៥ នាទីទៀត ។ ប្រសិនបើឈាមនៅតែហូរយើងត្រូវចាក់ ថ្នាំស្លឹក ដើម្បីកាត់បន្ថយការ ហូរឈាម ហើយដាក់ Gelatine Sponge, Surgicel or Fibrin Foam ក្នុងរណ្តៅដើម្បីជំនួយដល់កំនកឈាម ។

បន្ទាប់មកយើងទាញអព្ភាញនៅលើរណ្តៅ ចូលគ្នារួចដេរខ្លឹមមាត់ រណ្តៅ ។

ការឈឺចាប់ អាចកើតមានឡើង២ រឺ ៣ ម៉ោងក្រោយពីថ្នាំស្លឹកអស់ប្រសិទ្ធភាព ហើយអាចបន្តនៅជាច្រើនថ្ងៃ ។ ជាទូទៅ ការឈឺចាប់នេះ បណ្តាលមកពី Dry Socket ។ វាកើតនៅពេលអត់មានកំនកឈាមនៅក្នុងរណ្តៅ ហើយឆ្អឹងនៅក្នុងរណ្តៅបានប៉ះផ្តាស់ទៅនឹងខ្យល់ ហើយវាធ្វើអោយមានការឈឺចាប់ខ្លាំងក្លា ។ ពេលខ្លះធ្មេញនៅជាប់នឹងរណ្តៅក៏ឈឺដែរ ។



រណ្តៅធ្មេញគួរតែសាងជំរះដោយSaline រឺ Chlorohexidine
និង បិទបំពេញជាមួយ Antiseptic ដូចជា Alvogyl ។ ការដាក់
Zinc Oxide Eugenol ជាមួយសំលឹបន្តិច
ចូលក្នុងរណ្តៅធ្មេញអាចជួយសំបកឆ្អឹងជាសះស្បើយ ។ Dry
Socket ត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល ១ ទៅ ២ សប្តាហ៍
ហើយត្រូវការសំអាត និង ដាក់ថ្នាំ ២ រឺ ៣ ដង ដើម្បីអោយ
ជាសះស្បើយវិញ ។